

SATISFACCIÓN DEL PACIENTE EN CIRUGÍA DE ANTEPIE Y SU RELACIÓN CON LA SITUACIÓN FUNCIONAL Y CALIDAD DE VIDA

Jiménez Carrasco C¹, Domínguez Meléndez M¹, Pérez Romero C¹, Rocha Rico MC¹.

(1) Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz.

INTRODUCCIÓN

Siendo la cirugía de antepié una intervención frecuente en nuestro medio, más allá de la corrección radiológica y macroscópica de la corrección, precisamos conocer en qué medida la satisfacción de los pacientes está vinculada con una mejoría en su salud. El conocimiento de cómo influye el tratamiento en el concepto de calidad de vida relacionado con la salud (CVRS) puede influir en la decisión de someterse a esta cirugía y qué resultados podemos esperar.

OBJETIVOS


Evaluar los resultados funcionales y radiológicos de pacientes intervenidos de cirugía de antepié y buscar una correlación entre estos resultados y el efecto que producen sobre la calidad de vida del paciente.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realiza estudio ambispectivo descriptivo correlacional donde fueron evaluados 43 pacientes intervenidos de cirugía de antepié (hallux valgus, hallux rigidus o metatarsalgias) entre octubre del 2017 y marzo del 2018, un año tras la cirugía. Los criterios de exclusión fueron cirugías de revisión por fracaso de otras previas y deformidades de origen neurológico. A cada paciente se realizó una radiografía de control (RX) que se comparó con la RX preoperatoria, se registró su satisfacción personal tras la cirugía, se recogió su valoración funcional a través de la escala AOFAS (American Orthopaedic Foot and Ankle Society) para antepié y la valoración de su calidad de vida con la escala WHOQOL-BREF (Escala de calidad de vida de la Organización Mundial de la Salud). Se revisó el grado de correlación entre el resultado radiográfico, el resultado funcional y la calidad de vida, según las escalas utilizadas.

RESULTADOS

Un total de 37 mujeres y 6 hombres con una media de edad de 62 años, fueron sometidos a cirugías de antepié: 36 hallux valgus, 5 hallux rigidus y 2 metatarsalgias. El 6,9% (13) no obtuvo una corrección radiográfica adecuada. El 81,39% (35) se encontraba satisfecho con los resultados obtenidos. La puntuación media en la escala AOFAS fue 76,51, lo que indica un resultado general medio. La puntuación media en la escala WHOQOL en Salud Física transformada 4-20 fue 15,81. Se encontró una correlación estadísticamente significativa ($p=0,006$) entre la escala de valoración funcional de antepié y la escala de la calidad de vida con un incremento en el área de Salud Física transformada con un coeficiente de determinación de 0,061 por punto de escala funcional.



CONCLUSIONES

Los pacientes con una corrección radiográfica adecuada y un mayor nivel de funcionalidad según escala AOFAS presentan una discreta mejor calidad de vida según escala WHOQOL-BREF en el área de salud física.