

Tenorrafia percutánea como alternativa de tratamiento a la tenorrafia convencional. Resultados de 36 pacientes.

*Melodía Molinero Montes. Carlos Fernández Álvarez. Raul Sota Arce. Eduardo Diez Perez.
Hospital Sierrallana*



• INTRODUCCIÓN:

- La cirugía percutánea del tendón de aquiles combina las ventajas del tratamiento ortopédico y de la cirugía abierta, disminuyendo el tiempo de intervención y el número de complicaciones.

• OBJETIVOS:

- Presentamos nuestra experiencia en el tratamiento de 36 pacientes diagnosticados de roturas agudas del tendón de aquiles tratados mediante cirugía percutánea y anestesia local.

• MATERIAL Y MÉTODOS:

- 36 pacientes
- Rotura aguda de aquiles
- Edad media 48 años.
- 7 mujeres, 29 hombres.
- 33 relación con actividad deportiva.
- IQ: anestesia local (mepivacaína 1%).
- Reparación percutánea Orthocord n.º 5.
- Bota Walker larga fija 5 semanas con cuñas equinizantes.

• RESULTADOS:

- No necesidad RHB.
- Puntillas monopodales media a los 2 meses
- Actividad deportiva media 6 meses.
- Re-rotura en un paciente a los 2 meses, reintervenido sin complicaciones.
- Una infección superficial tratada con amoxi-clavulánico vía oral.

