

TRATAMIENTO DE DISCREPANCIA DE LONGITUD DE EXTREMIDADES INFERIORES SECUNDARIA A PSEUDOARTROSIS DE FÉMUR DISTAL

Inés De Blas Sanz, Javier Nistal Rodríguez, Alejandro Bañuelos Díaz, Juan José González Álvarez, Diego Fernández Díez, Jesús Díez Rodríguez


INTRODUCCIÓN

- La discrepancia de longitud de extremidades inferiores en adultos es una entidad poco frecuente,
- La mayor parte de los casos se relaciona con secuelas postraumáticas.


MATERIAL Y MÉTODOS

Mujer 38 años

Precipitada



Fractura IIIA fémur distal derecho con interrupción aparato extensor



RAFI cerclaje de la rótula, tornillos canulados, clavo retrógrado y placa lateral bloqueada en fémur distal




Pseudoartrosis atrófica



EMO + refrescar pseudoartrosis + clavo retrógrado

Dismetría 6 cm

Clavo PRECICE
1 mm/ día
2 meses
Telescopaje 6,3 cm



RESULTADOS

- No complicaciones neurológicas 2ª al alargamiento
- 3m: inicio deambulación
- Actualmente, deambulación sin muletas, flexión 90º, extensión completa, patela baja y contractura abductores

CONCLUSIONES

- El alargamiento óseo con enclavado endomedular tipo Precice es una buena alternativa para pacientes que presentan discrepancias de longitud de miembros inferiores postraumáticas.