

ARTROPLASTIA DE CODO COMO RESCATE PARA LUXACIÓN INVETERADA DE CODO

AUTORES: JUAN PABLO GUZMÁN ZAPATA, CARMEN SALVAT DAVILA, GERARDO DÍAZ QUIRÓS, BORJA FERNÁNDEZ BLANCO, IMANOL PEREZ HEVIA, MARIO MARTIN BECERRA VARGAS

INTRODUCCION

La luxación de codo inveterada, es una entidad poco frecuente en los pacientes adultos, la literatura señala que está probado que se presentan datos de inestabilidad importante en la articulación dañada, por lo que es más difícil realizar una plastia de ligamentos y generalmente se presentan fracturas osteocondrales.

OBJETIVOS:

demostrar nuestra experiencia, en el caso que se expone, al realizar una artroplastia de codo, como cirugía de revsion, después de una ligamentoplastia y reducción abierta.

MATERIAL Y METODOS:

paciente mujer que presento una fractura de cúpula radial, 3 años antes, acude al servicio de urgencias, por presentar una luxación inveterada de codo izq. de 12 meses de evolución, por lo que se realiza una cirugía abierta, donde primero se realiza una ligamento plastia, con varios túneles, se realiza una plastia olecrano, humeral, en dirección vertical, además una reconstrucción de la parte interna del codo, con 2 fascículos, durante la cirugía se realizan pruebas de estabilidad y movilidad, bajo escopia, se coloca una ortesis, con limitación para la extensión, por 2 meses, y posteriormente, se aprecia recidiva de luxacion, se decide una artroplastia de codo tipo conrad Murray.

RESULTADOS:

la paciente presenta una movilidad en extensión de 120 °, y flexión completa, también presenta una perdida de fuerza, con buena movilidad.



CONCLUSIONES:

las luxaciones de codo es una patología, poco frecuente y de difícil manejo, la artroplastia de codo, es una técnica fiable y reproducible en casos de revisión.

